

HAT-QoL*

Manual de Pontuação

*Adaptado de HIV/AIDS-Targeted Quality of Life Instrument
William C. Holmes, M.D., M.S.C.E., 1999.

Este projeto contou com apoio da Bristol Myers Squibb através de um grant educacional sem restrição.

Dimensões avaliadas pelo HAT-QoL

1. Função geral, 6 itens
2. Satisfação com a vida, 4 itens
3. Preocupações com a saúde, 4 itens
4. Preocupações financeiras, 3 itens
5. Preocupações com a medicação, 5 itens
6. Aceitação do HIV, 2 itens
7. Preocupações com o sigilo, 5 itens
8. Confiança no profissional, 3 itens
9. Função sexual, 2 itens

Descrição da pontuação

Todas as dimensões são pontuadas e o escore final de cada dimensão é transformado em uma escala linear de 0-a-100, onde 0 é o pior escore possível e 100 é o melhor escore possível. A obtenção do escore final da dimensão transformado é feita em quatro passos:

1. Atribua um valor para todas as respostas, item por item, como anotado abaixo. A maioria dos itens será valorada usando o Código A, alguns serão valorados usando o Código B.

<u>Opção de Resposta</u>	<u>Código A</u>	<u>Código B</u>
"Todo o tempo"	1	5
"A maior parte do tempo"	2	4
"Parte do tempo"	3	3
"Pouco tempo"	4	2
"Nunca"	5	1

2. Use o Código A para os seguintes itens: 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9a, 9b

3. Use o Código B para os seguintes itens: 1a, 2a, 2b, 2c, 2d, 8a, 8b, 8c

4. Se a resposta para um item em uma dimensão não estiver completa, substitua o item que está faltando pela média dos valores imputados para os outros itens que estão completos (desde que pelo menos metade dos itens tenha sido completada). Por exemplo, se um item de uma dimensão de quatro itens não está completo, e os valores imputados para os outros são "1," "2," e "4," o valor da média a ser imputada para o item que está faltando é "2.33." Se mais da metade dos itens de uma dimensão não está completa, nenhuma substituição deve ser feita e o escore final para essa dimensão deve ser considerado perdido.

5. Some os valores atribuídos para todos os itens de uma dimensão para conseguir o valor total do escore dessa dimensão (abaixo, o valor do escore total imputado para a dimensão função geral será indicado pelo termo “FUNGER”, satisfação com a vida por “SAVI”, preocupações com a saúde por “PRESA”, preocupações financeiras por “PREFI”, preocupações com a medicação por “PREME”, aceitação do HIV por “ACEHIV”, preocupações com o sigilo “DISWO” confiança no profissional por “CONPRO” e função sexual por “FUSEX”).

6. Transforme o valor do escore total imputado para cada dimensão para uma escala de 0-a-100 usando a seguinte fórmula:

Função geral:

$$\text{FUNGER100} = (100/(30-6))*(\text{FUNGER}-6)$$

Onde FUNGER é o valor total do escore atribuído para a dimensão função geral;

Satisfação com a vida:

$$\text{SAVI100} = (100/(20-4))*(\text{SAVI}-4)$$

Onde SAVI é o valor total do escore atribuído para a dimensão satisfação com a vida;

Preocupações com a saúde:

$$\text{PRESA100} = (100/(20-4))*(\text{PRESA}-4)$$

Onde PRESA é o valor total do escore atribuído para a dimensão preocupações com a saúde;

Preocupações financeiras:

$$\text{PREFI100} = (100/(15-3))*(\text{PREFI}-3)$$

Onde PREFI é o valor total do escore atribuído para a dimensão preocupações financeiras;

Preocupações com a medicação: $PREME100 = (100/(25-5))*(PREME-5)$
Onde PREME é o valor total do escore atribuído para a dimensão preocupações com a medicação;

Aceitação do HIV: $ACEHIV100 = (100/(10-2))*(ACEHIV-2)$
Onde ACEHIV é o valor total do escore atribuído para a dimensão aceitação do HIV;

Preocupações com o sigilo: $PRESI100 = (100/(25-5))*(PRESI-5)$
Onde PRESI é o valor total do escore atribuído para a dimensão preocupações com o sigilo;

Confiança no profissional: $CONPRO100 = (100/(15-3))*(CONPRO-3)$
Onde CONPRO é o valor total do escore atribuído para a dimensão confiança no profissional;

Função sexual: $FUSEX100 = (100/(10-2))*(FUSEX-2)$
Onde FUSEX é o valor total do escore atribuído para a dimensão função sexual;

APÊNDICE

* Quando atribuir valores para as opções de resposta, use o "Código A" para este item;

† Quando atribuir valores para as opções de resposta, use o "Código B" para este item;

Função geral

- 1a. Nas últimas 4 semanas, fiquei satisfeito com a minha atividade física.†
- 1b. Nas últimas 4 semanas, senti-me fisicamente limitado para realizar tarefas domésticas de rotina.*
- 1c. Nas últimas 4 semanas, a dor limitou minha capacidade de estar fisicamente ativo.*
- 1d. Nas últimas 4 semanas, fiquei preocupado com a possibilidade de não ser mais capaz de realizar minhas atividades diárias de rotina/trabalho como antes.*
- 1e. Nas últimas 4 semanas, senti que ter o HIV tem limitado o volume de trabalho que sou capaz de realizar em minhas atividades diárias de rotina/trabalho.*
- 1f. Nas últimas 4 semanas, senti-me muito cansado para atividades sociais.*

Satisfação com a vida

- 2a. Nas últimas 4 semanas, desfrutei a vida.†
- 2b. Nas últimas 4 semanas, senti-me no controle da minha vida.†
- 2c. Nas últimas 4 semanas, fiquei satisfeito com o meu nível de atividades sociais.†
- 2d. Nas últimas 4 semanas, fiquei contente por ter estado tão saudável.†

Preocupações com a saúde

- 3a. Nas últimas 4 semanas, não fui capaz de viver do jeito que gostaria por estar muito preocupado com a minha saúde.*
- 3b. Nas últimas 4 semanas, fiquei preocupado com a minha contagem CD4.*
- 3c. Nas últimas 4 semanas, fiquei preocupado com a minha carga viral.*
- 3d. Nas últimas 4 semanas, fiquei preocupado, pensando em quando morreria.*

Preocupações financeiras

- 4a. Nas últimas 4 semanas, fiquei preocupado com a possibilidade de ter de viver com uma renda determinada.*
- 4b. Nas últimas 4 semanas, fiquei preocupado se terei como pagar as minhas contas.*
- 4c. Nas últimas 4 semanas, tive muito pouco dinheiro para poder cuidar de mim mesmo do jeito que acho correto.*

Preocupações com a medicação

- 5a. Nas últimas 4 semanas, tomar meus remédios tem sido um peso.*
- 5b. Nas últimas 4 semanas, tomar meus remédios me dificultou levar uma vida normal.*
- 5c. Nas últimas 4 semanas, meus remédios têm me causado efeitos colaterais desagradáveis.*
- 5d. Nas últimas 4 semanas, fiquei preocupado com os efeitos que a minha medicação pode ter sobre o meu corpo.*
- 5e. Nas últimas 4 semanas, não tive certeza quanto aos motivos que me levam a tomar os remédios.*

Aceitação do HIV

- 6a. Nas últimas 4 semanas, me arrependi da forma como levei minha vida antes de saber que tinha o HIV.*
- 6b. Nas últimas 4 semanas, fiquei zangado com o comportamento de risco e exposição ao HIV que adotei no passado.*

Preocupações com o sigilo

- 7a. Nas últimas 4 semanas, limitei o que falo para os outros sobre mim mesmo.*
- 7b. Nas últimas 4 semanas, tive medo de contar a outras pessoas que eu tenho HIV.*
- 7c. Nas últimas 4 semanas, fiquei preocupado que minha família descobrisse que eu tenho HIV.*
- 7d. Nas últimas 4 semanas, fiquei preocupado que as pessoas do meu trabalho ou que participam de minhas atividades do dia-a-dia descobrissem que eu tenho HIV.*
- 7e. Nas últimas 4 semanas, fiquei preocupado com a possibilidade de perder minha fonte de renda se outras pessoas descobrirem que eu tenho HIV.*

Confiança no profissional

- 8a. Nas últimas 4 semanas, senti que poderia ver meu médico sempre que precisasse ou sentisse necessidade.†
- 8b. Nas últimas 4 semanas, senti que meu médico me consulta ao tomar decisões sobre o meu tratamento.†
- 8c. Nas últimas 4 semanas, senti que meu médico se importa comigo.†

Função sexual

- 9a. Nas últimas 4 semanas, foi difícil ficar sexualmente excitado.*
- 9b. Nas últimas 4 semanas, foi difícil chegar ao orgasmo.*